

Psychiatrie WS 07/08

[] Anmerkung,

*= nachgeschlagen (r=Angabe richtig/ f = Angabe falsch)

1 ---

2

Diagnosekriterien für Abhängigkeitssyndrom nach ICD-10:

- | | |
|---|----|
| 1. Starker Wunsch o. Zwang psychotrope Sbst. zu konsumieren | *r |
| 2. Depressives Syndrom | f |
| 3. verminderte Kontrollfähigkeit | *r |
| 4. Amnestisches Syndrom | f |
| 5. Vernachlässigung anderer Interessen und Vergnügungen | *r |

3

Welche der folgenden Wahnformen ist bei Patienten mit schwerer depressiver Episode am wenigsten charakteristisch?

- | | |
|--------------------------|----|
| a) Verfolgungswahn | r |
| b) Schuldwahn | f |
| c) hypochondrischer Wahn | f |
| d) Verarmungswahn | r |
| e) nihilistischer Wahn | *r |

4

Die Depression kann bedingt sein durch:

- 1) Antibiotika
 - 2) Hirntumor
 - 3) Hypothyreose
 - 4) Demenzielle Erkrankungen
 - 5) Hirninfarkt
- A) 1, 2
B) 2, 4
C) 1, 3, 4
D) 1, 3, 5
E) 1- 5

E

5

Was gehört zu der Positivsymptomatik der Schizophrenie?

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Halluzination | *r |
| 2. Wahn | *r |
| 3. sozialer Rückzug | *f [Negativsymptom] |
| A 1 | |
| B 2 | |
| C 1,2 | |
| D 1,3 | |
| E 1-3 | |

A

6---

7 ---

8 ---

9 ---

10

Was sind charakteristische Symptome während einer Panikattacke bei der Panikstörung (nach ICD-10)?

- | | |
|----------------------------------|----|
| 1. Gefühl der Luftnot | *r |
| 2. Derealisation | *r |
| 3. Gefühl der drohenden Ohnmacht | r |
| 4. Furcht, verrückt zu werden | *r |
| 5. Verfolgungswahn | f |

A nur 1

B nur 3

C nur 1, 2, 3

D nur 1, 2, 3, 4

E nur 1, 2, 3, 5

D

11

Was gehört zu den inhaltlichen Denkstörungen?

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| 1, Zerfahrenheit | *f [strukturelle Denkstörung] |
| 2, Perseveration | *f [strukturelle Denkstörung] |
| 3, Wahn | *r |
| 4, Neologismen | *f [strukturelle Denkstörung] |
| 5, Halluzinationen | f |

A ...

B ...

C nur 3 ist richtig

D ...

E 3,4,5 sind richtig

C

12 ---

13 ---

14

Was gehört zu den Symptomen 1. Ranges nach K. Schneider?

- 1) Leibhalluzinationen [nur akustische Halluzinationen sind 1. Ranges] *f
 - 2) Stimmen hören, die in der 3 Person über einen Reden r
 - 3) sozialer Rückzug f
 - 4) Wahnwahrnehmungen [Wahneinfall = 2.Ranges] *r
 - 5) Zönästhesie [zönästhetische Halluzination = 2. Ranges] f
- A) 1
B) 2
C) 124
D) 245
E) alle D

15

Elne Patientin entwickelt 1 Woche nach Beginn einer neuroleptischen Therapie Zungenkrämpfe, Blickkrämpfe, choreatische Bewegungen des Halses und der oberen Extremität.

Welcher Typ einer medikamentösen UAW liegt vor?

- malignes neuroleptisches Syndrom
- Frühdyskinesien x
- Parkinson-Syndrom
- tardive Dyskinesie
- Tasikinesie

16 ---

17

Was zählt zur frühkindlichen Regulationsstörung?

- 1 Vermehrtes Schreien (länger als 3 Stunden, mehr als 3 mal pro Woche, über 3 Wochen) f
 - 2 Gerötete und aufgekratzte Haut infolge Neurodermitis f
 - 3 Fütterungszeiten von länger als 45 min mit Abständen von weniger als 2 Stunden nach dem ersten Geburtstag f
 - 4 Adynamie und muskuläre Hypotonie r
 - 5 Lange Einschlafphasen über mehrere Stunden und häufiges nächtliches Erwachen mit langen Wachphasen f
- A 1, 3, 5
B
C ? A

18

Welche Aussage zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen trifft nicht zu?

- A) Das Aspergersyndrom und der frühkindliche Autismus gehören neben dem Rett-Syndrom zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. *r
 - B) Das Aspergersyndrom unterscheidet sich vom frühkindlichen Autismus durch ein Fehlen der sozialen und kommunikativen Behinderung. [Asperger: keine Entwicklungsverzögerung] f
 - C) Das Aspergersyndrom unterscheidet sich in der Regel vom frühkindlichen Autismus durch eine höhere Intelligenzentwicklung. [frühkindl. A. häufig geist. Behinderung] *r
 - D) Bei autistischen Störungen beobachtet man eine Sensibilität gegenüber Veränderungen der Umwelt. *r
 - E) Legasthenie und Rechenschwäche gehören nicht zu den tiefgreifenden Entwicklungsstörungen. *r
- B

19

Was trifft zu?

- A) Schulphobie ist Ausdruck leistungsmässiger schulischer Überforderung. [Schulangst] *f
- B) Schulphobie ist im Gegensatz zur Schulangst leicht durch Wegnahme des angstausslösenden Faktors zu beheben. [Hausunterricht?!, Mutter in Schule?!] *f
- C) Schulverweigerung hat viele Ausdrucksformen und viele Ursachen und muss deshalb ganz unterschiedlich behandelt werden. r
- D) Schulschwänzen ist selten mit anderen sozialen Auffälligkeiten verbunden und beruht nur auf einer Trennungsangst. f
- E) Schulphobie, Schulangst und Schulverzweigerung sind alle ein und das Selbe. f
C

20

Mehrfachauswahl:

Welche körperlichen Komplikationen können bei Anorexia nervosa auftreten?

1. Bradykardie um 30-40/min r
2. lebensbedrohliche Hypokaliämie *r
3. Ödeme [Nierenversagen]
4. Lanugobehaarung
[= Behaarung des Fetus][kann womögl. Bei Anorexie wieder vorkommen?]
5. primäre und sekundäre Amenorrhoe *r

A alle richtig

B 1,2,5 richtig

C 1,2,3,5 richtig

D...
