

Psychiatrie Nachklausur WS07/08

(Fr. 11.4.08)

1 Zuordnung: (Altfrage)

Depression	zeitlich desorientiert
Soziale Phobie	Vermeidungsverhalten
Schizophrenie	Gedankenentzug

2 Symptome des Alkoholentzugs: (Mehrfachauswahl oder Einfach-Negativ-Auswahl)

Delir
Akustische Halluzination
nicht: epileptische Anfälle

3 Therapie der Manie: (Mehrfachauswahl)

Lithium
Benzos
Typische Neuroleptika
Atypische Neuroleptika
Antidepressiva

4 In welcher Altersgruppe ist nach erstmaliger Depression die Suizidalität am wahrscheinlichsten?

Junge Frauen
Junge Männer
Junge Männer & alte Frauen
Alte Frauen
Alte Männer

5 Zuordnung: (Altfrage)

Halluzination	Wahrnehmung von etwas nicht vorhandenem, die Täuschung wird nicht erkannt
Pseudohalluzination	Wahrnehmung von etwas nicht vorhandenem, die Täuschung wird erkannt Wahrnehmung von etwas vorhandenem, wird falsch interpretiert (z.B. Schatten als Person)

6 Zuordnung: (Altfrage)

Alzheimer-Demenz	schleichender Beginn ohne neurologische Herdsymptome
Vaskuläre Demenz	akuter Beginn mit neurologischen Herdsymptomen Akinetischer Mutismus und Myoklonien Blasenentleerungs- und Gangstörungen Rigor, Tremor, Akinese

(DD: Multi-Infarkt-Demenz, Parkinson)

7 Bei der Schizophrenie zählen zu den Symptomen 1. Ranges nach Kurt Schneider: (Altfrage)

8 Symptome der Manie:
Gedankenabriß

9 Ein 25 jähriger Mann berichtet, seine Nachbarn hätten seine Wasserleitungen vergiftet und würden ihn durch die Wände mit Laser beschießen.

Welche Differentialdiagnosen kommen in Betracht? (Mehrfachantwort)

Langjähriger Cannabis-Missbrauch

Derealisation

Depersonalisation

Alkoholentzug

(Selbst oder andere Frage?:

Der/ Ein Patient schneidet sich, um seinen Körper spüren zu können.)

10 Zuordnung?:

Schulphobie

Trennungsangst